

## PROCEDIMENTO PARA A COLHEITA DE AMOSTRAS DE MATÉRIA VEGETAL (Folhas)

DG-2/1

Cultura	Época de colheita	Órgãos ou parte da planta a colher	Nº de Plantas para compor a amostra
Abacateiro	Setembro/Outubro	Folhas completamente desenvolvidas, com 5-7 meses de idade, de ramos não frutíferos, colhendo 4 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
Actinídea (kiwi)	Início do engrossamento dos frutos (meados Julho)	Folhas inteiras de ramos frutíferos do ano, a 1,70m do chão, colhendo 2 folhas por planta, anexas ao último fruto contado a partir da base de lançamento	15
	Antes da floração	Folha mais nova completamente desenvolvida	15
Alface	A meio do ciclo vegetativo	Folha intermédia completamente desenvolvida	20-30
Ameixeira	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
Amendoeira	Meados da estação de crescimento	Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os pontos cardeais	15
Amora	Início da floração	Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem	15
Aveleira	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Par de folhas completamente desenvolvidas dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
Batata	Aos 30cm altura, a meio crescimento do tubérculo	Folha mais nova completamente desenvolvida	20-30
Cerejeira	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Folhas inteiras do terço médio do lançamento do ano inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
Citrinos	Setembro/Outubro	Folhas inteiras, com 4-7 meses de idade, de ramos não frutíferos de rebentação da Primavera, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas inteiras por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
Figueira	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Folhas completamente desenvolvidas, do terço médio do lançamento do ano, de ramos não frutíferos, colhendo 1-2 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
Framboesa	Início da floração	Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem	15
Macieira	90-120 dias	Folhas do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais	15
Melancia	Do início floração à frutificação	5ª folha mais nova completamente desenvolvida	12-15
Melão, Meloa	Do início floração à colheita	5ª folha mais nova completamente desenvolvida	12-15
Milho	Fase anterior ao embandeiramento	Folha mais nova completamente desenvolvida	15-20
Mirtilo	Verão	Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem	75
Morangueiro	À floração ou início frutificação	Folha mais nova completamente desenvolvida	30-40
Nogueira	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Par de folíolos da parte central do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhidos em 4 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
Oliveira	Endurecimento do caroço (Julho/Agosto)	Folhas inteiras e sãs do terço médio dos lançamentos da Primavera anterior, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais	15
Pepino	Do início da floração à colheita	5ª folha mais nova completamente desenvolvida	12-15
Pessegueiro	Julho/Agosto	Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
Pereira	100 - 110 dias após plena floração	Folhas do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais	15
Pimento	Da 1ª floração ao 1/3 da floração final	Folha mais nova completamente desenvolvida	25-30
Tomateiro	Na formação dos cachos florais	Folha mais nova completamente desenvolvida adjacente à inflorescência do topo	20-25
Videira	Plena floração	Folhas opostas ao cacho basal, com pecíolos, inseridas no terço médio do braço, colhendo 2 folhas por videira. Destacar os pecíolos ainda na vinha	40

**Modo de envio:** Envolver os órgãos ou parte da planta colhida em papel absorvente (ex. papel de cozinha) e enviar por correio azul ou verde, quando a entrega direta no laboratório não for possível.

