

MATERIAL NECESSÁRIO

 Papel absorvente (ex. papel de cozinha) e sacos de papel.

QUANTIDADES E PROCEDIMENTO DE COLHEITA

Cultura	Época de colheita	Órgãos ou parte da planta a colher	Nº de Plantas para compor a amostra
ABACATEIRO	Setembro/Outubro	Folhas completamente desenvolvidas, com 5-7 meses de idade, de ramos não frutíferos, colhendo 4 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
ACTINÍDEA (KIWI)	Início do engrossamento dos frutos (meados Julho)	Folhas inteiras de ramos frutíferos do ano, a 1,70m do chão, colhendo 2 folhas por planta, anexas ao último fruto contado a partir da base de lançamento	15
	Antes da floração	Folha mais nova completamente desenvolvida	15
ALFACE	A meio do ciclo vegetativo	Folha intermédia completamente desenvolvida	20-30
AMEIXEIRA	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
AMENDOEIRA	Meados da estação de crescimento	Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os pontos cardeais	15
AMORA	Início da floração	Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem	15
AVELEIRA	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Par de folhas completamente desenvolvidas dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
BATATA	Aos 30cm altura, a meio crescimento do tubérculo	Folha mais nova completamente desenvolvida	20-30
CEREJEIRA	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Folhas inteiras do terço médio do lançamento do ano inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
CITRINOS	Setembro/Outubro	Folhas inteiras, com 4-7 meses de idade, de ramos não frutíferos de rebentação da Primavera, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas inteiras por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
FIGUEIRA	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Folhas completamente desenvolvidas, do terço médio do lançamento do ano, de ramos não frutíferos, colhendo 1-2 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
FRAMBOESA	Início da floração	Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem	15
MACIEIRA	90-120 dias	Folhas do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais	15
MELANCIA	Do início floração à frutificação	5ª folha mais nova completamente desenvolvida	12-15
MELÃO, MELOA	Do início floração à colheita	5ª folha mais nova completamente desenvolvida	12-15

Cultura	Época de colheita	Órgãos ou parte da planta a colher	Nº de Plantas para compor a amostra
MILHO	Fase anterior ao embandeiramento	Folha mais nova completamente desenvolvida	15-20
MIRTILO	Verão	Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem	75
MORANGUEIRO	À floração ou início frutificação	Folha mais nova completamente desenvolvida	30-40
NOGUEIRA	Meados da estação de crescimento (Julho/Agosto)	Par de folíolos da parte central do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhidos em 4 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
OLIVEIRA	Endurecimento do caroço (Julho/Agosto)	Folhas inteiras e sãs do terço médio dos lançamentos da Primavera anterior, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais	15
PEPINO	Do início da floração à colheita	5ª folha mais nova completamente desenvolvida	12-15
PESSEGUEIRO	Julho/Agosto	Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais	15
PEREIRA	100 - 110 dias após plena floração	Folhas do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais	15
PIMENTO	Da 1ª floração ao 1/3 da floração final	Folha mais nova completamente desenvolvida	25-30
ROSEIRA	Durante o período de produção	Folhas superiores, sem pecíolo, do caule floral	20-30
TOMATEIRO	Na formação dos cachos florais	Folha mais nova completamente desenvolvida adjacente à inflorescência do topo	20-25
TRIGO, ARROZ, CEVADA, AVEIA, CENTEIO	Imediatamente antes do espigamento	As quatro folhas superiores	50-100
VIDEIRA	Plena floração	Folhas opostas ao cacho basal, com pecíolos, inseridas no terço médio do braço, colhendo 2 folhas por videira. Destacar os pecíolos ainda na vinha	40

TRANSPORTE E ENVIO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE

Envolver os órgãos ou parte da planta colhida em papel absorvente (ex. papel de cozinha). A entrega das amostras deve ser feita até 24 horas depois da colheita. No caso de não ser possível a entrega no laboratório no próprio dia da colheita, deve colocar a amostra em refrigeração. A amostra também pode ser enviada por correio azul ou verde, numa embalagem adequada para dar entrada no laboratório no espaço de 24 horas.

NOTA: Deve ser SEMPRE preenchida a ficha de requisição e esta enviada juntamente com a amostra para que o laboratório possa dar seguimento ao processo.

